

# PERCEPCIÓN SOCIAL DE LA ENFERMERÍA DE LOS PACIENTES EN HEMODIÁLISIS: ESTUDIO COMPARATIVO

**JOSÉ LUIS COBO SÁNCHEZ NOELIA MANCEBO SALAS M<sup>a</sup> SORAYA SÁNCHEZ CANO ANA ISABEL PÉREZ GARMILLA HORTENSIA CEPA GARCÍA SALVADORA PEIRÓ SAMPAYO ROSA ALONSO NATES**

—————**HOSPITAL UNIVERSITARIO MARQUÉS DE VALDECILLA. SANTANDER.**

## INTRODUCCIÓN

En los últimos años, nuestra profesión esta sufriendo grandes cambios. La Enfermería, al igual que otras diplomaturas, va a avanzar como ciencia al integrarnos en el Espacio Europeo de Educación Superior, teniendo acceso a una formación más completa y con un claro perfil investigador al acceder al doctorado. El próximo desarrollo de las Especialidades enfermeras y la prescripción enfermera, suponen un cambio cualitativo en el perfil profesional. Sin embargo, como profesión dedicada a la sociedad, ¿cuál es la percepción individual de la sociedad ante estos cambios?, ¿de qué manera es la sociedad consciente de estos avances?

## OBJETIVO

Evaluar el conocimiento que tienen los pacientes en hemodiálisis de nuestra profesión y compararla con la de otros grupos sociales.

## MATERIAL Y MÉTODO

Estudio prospectivo descriptivo mediante cuestionario autocompletado acerca de aspectos sociales relacionados con la enfermería (10 preguntas cerradas con varias respuestas posibles). Otras variables: edad, sexo, nivel de estudios. Se encuestaron 92 sujetos de distintas poblaciones:

- Pacientes en hemodiálisis crónica (HD) (40 sujetos).
- Pacientes con patología cardíaca aguda del servicio de Urgencias (UR) (16 sujetos).
- Pacientes de Neurología (NR) (13 sujetos).
- Estudiantes de ciclos formativos de grado medio/superior (ES) (23 sujetos).

## RESULTADOS

Edad media: 50,9±24,86 años, 65,22% fueron hombres. Más del 40% con estudios elementales. El 35,9% pensaba que los estudios necesarios para ser enfermer@ era un módulo de grado medio/superior (HD 15%, UR 18,8%, NR 7,7%, ES 56%). El 56% pensaba que un instituto de investigación era un lugar de trabajo de la enfermera, pero tan sólo un 42% pensaba que investigar es una de nuestras funciones (HD 72,5%, UR 43,8%, NR 23%, ES 0%). Sólo el 10% pensaba que prescribir medicamentos era una función de la enfermera (HD 7,5%, UR 12,5%, NR 15,4%, ES 13%). El 69% no conocía ninguna especialidad enfermera. Para el 42,5% de los pacientes en HD la enfermería nefrológica debería ser una especialidad. Todos los pacientes de HD y NR pensaban que somos necesarios (UR 87,5%, ES 87%). El 74% pensaban que tanto hombres como mujeres desempeñaban bien la función de enfermera. El 81% pensaba que debíamos seguir formándonos.

## CONCLUSIONES

Una gran mayoría desconoce cuáles son los estudios para ser enfermer@. La prescripción enfermera parece más una reivindicación profesional que una demanda social. Parece que las especialidades no son muy conocidas, pero los pacientes en HD dan importancia a la especialización de quiénes les cuidan. La formación continuada y la actividad investigadora son rasgos que destaca la sociedad como propias de la Enfermería.

## BIBLIOGRAFÍA:

1.-Fajardo Trasobares M<sup>a</sup> Esther, Germán Bes Concha. Influencia del género en el reconocimiento de los cuidados enfermeros visibles e invisibles. Index Enferm. [periódico en la Internet]. 2004 Nov [Consultado 11 Enero 2009]; 13(46): 09-12. Disponible en: [http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962004000200002&lng=es&nrm=iso](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962004000200002&lng=es&nrm=iso).

2.-García Bañón Ana M<sup>a</sup>, Sainz Otero Ana, Botella Rodríguez Manuel. La enfermería vista desde el género. Index Enferm. [periódico en la Internet]. 2004 Nov [Consultado 11 Enero 2009] ; 13(46): 45-48. Disponible en:

[http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci\\_arttext&pid=S1132-12962004000200009&Ing=es&nrm=iso](http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132-12962004000200009&Ing=es&nrm=iso).

3.-Hernández Vergel LL, Rodríguez Brito ME, Jiménez Pérez M, Rangel Marín F. Imagen social de la enfermería. Rev Cubana Enfermer 2003;19(1): 250-269.

