

RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA

Dominio: Seguridad-Protección

DEFINICIÓN

Riesgo de que la piel del acceso vascular se vea negativamente afectada.

RESULTADOS	INTERVENCIONES	INDICADORES
Integridad del acceso de diálisis.	Vigilancia de la piel.	<ul style="list-style-type: none">• Coloración cutánea local.• Ausencia de hematoma local.• Ausencia de edema periférico. <p>Escala: desviación extrema para el rango esperado a sin desviación para el rango esperado.</p>
Control del riesgo.		<ul style="list-style-type: none">• Reconoce el riesgo.• Modifica el estilo de vida para reducir el riesgo. <p>Escala: nunca manifestado a manifestado constantemente.</p>



RIESGO DE DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA

FACTORES DE RIESGO

- Alergias al esparadrapo.
- Hematomas repetidos.
- Zonas con punciones repetidas.
- Pacientes con vías centrales.

ESCALAS

1. Nunca manifestado, 2. Raramente manifestado, 3. En ocasiones manifestado, 4. Con frecuencia manifestado, 5. Manifestado constantemente.

1. Desviación extrema para el rango esperado, 2. Desviación importante para el rango esperado, 3. Desviación moderada para el rango esperado, 4. Desviación leve para el rango esperado, 5. Sin desviación para el rango esperado.

DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA

Dominio: Seguridad-Protección

DEFINICIÓN

Alteración de la piel de la zona del acceso vascular.

RESULTADOS	INTERVENCIONES	INDICADORES
Integridad del acceso de diálisis.	<ul style="list-style-type: none">• Cuidado de la herida.• Administración de medicación tópica.	<ul style="list-style-type: none">• Coloración cutánea local.• Ausencia de hematoma local.• Ausencia de edema periférico. <p>Escala: desviación extrema para el rango esperado a sin desviación para el rango esperado.</p>



DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA

CARACTERÍSTICAS DEFINITORIAS

- **Alteración de la superficie de la piel.**

ESCALA

1. Desviación extrema para el rango esperado, 2. Desviación importante para el rango esperado, 3. Desviación moderada para el rango esperado, 4. Desviación leve para el rango esperado, 5. Sin desviación para el rango esperado.

RIESGO DE INFECCIÓN

Dominio: Seguridad-Protección

DEFINICIÓN

Aumento de riesgo de ser invadido por microorganismos patógenos en accesos vasculares.

RESULTADOS	INTERVENCIONES	INDICADORES
Control del riesgo.	Control de infecciones.	<ul style="list-style-type: none">• Reconoce el riesgo.• Modifica el estilo de vida para reducir el riesgo. <p>Escala: nunca manifestado a manifestado constantemente.</p>



RIESGO DE INFECCIÓN

FACTORES DE RIESGO

- Pacientes con fístulas arteriovenosas.
- Pacientes con vías centrales (transitorias o permanentes).
- Pacientes portadores de *S. aureus*.
- Pacientes con déficit de higiene.

ESCALA

1. Nunca manifestado,
2. Raramente manifestado,
3. En ocasiones manifestado,
4. Con frecuencia manifestado,
5. Manifestado constantemente.