

## EL SARM EN UNA UNIDAD DE HEMODIALISIS.

### IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL.

Núria Boixader Dumanjó, Núria Estany Ramió, Carmen Fuentes Bolasell, Marta Moradell Callís, Pilar Ortega Hermosilla, Anna Serra Collell.

Unidad de Asistencia Nefrológica, Hospital Comarcal de l'Alt Empordà. Figueres

### INTRODUCCION

La idea de realizar este trabajo surgió a raíz de la inquietud que causó la aparición, en nuestra Unidad de Hemodiálisis, de un brote agudo de Staphylococcus Aureus resistente a la Meticilina (SARM), en un corto periodo de tiempo, en un mes.

La infección intrahospitalaria por bacterias multiresistentes a los antibióticos, se ha convertido en un problema de salud pública, que requiere una estrecha vigilancia y control, para poder definir los factores de riesgo predominantes e implantar unas medidas de prevención y control.

El Staphylococcus Aureus Resistente a la Meticilina (SARM), apareció como patógeno nosocomial en la década de los 60.

El Staphilococcus aureus es un coco Gram Positivo y uno de los que con más frecuencia producen infecciones en el hombre. Coloniza con frecuencia en piel y mucosas. La localización más frecuente del SARM son las fosas nasales de los adultos, se puede ser portador de este microorganismo en periodos **prolongados e intermitentes** de tiempo; también puede colonizar la piel, el trato intestinal y la nasofaringe.

La importancia de este patógeno radica en el riesgo potencial de transmisión nosocomial, la aparición de brotes epidémicos y el limitado número de antibióticos efectivos.

Es más frecuente la colonización de pacientes hospitalizados, diabéticos insulino-dependientes, drogadictos endovenosos, pacientes en hemodiálisis crónica y pacientes de residencias geriátricas.

Este microorganismo no invade la piel sana, pero mínimas roturas de la barrera cutáneo-mucosa (dermatitis, úlceras, catéteres venosos) le permiten penetrar en los tejidos y causar una gran variedad de infecciones.

#### ➡ **MODOS DE TRANSMISIÓN**

1. La vía más frecuente de transmisión para la mayor parte de las bacterias dentro del hospital, son las manos del personal sanitario y el SARM no es una excepción.
2. La transmisión a través del aire es infrecuente.
3. La transmisión a través de los objetos inanimados, aunque discutida, puede ser importante en poblaciones especiales, tales como Unidades de Cuidados Intensivos y quemados, en elementos de contacto directo con el paciente (ropa de cama, sillas de ruedas,...).

#### **FACTORES DE RIESGO**

- Edad
- Inmunosupresión
- Higiene deficiente
- Diabéticos
- Pacientes institucionalizados
- Lesiones cutáneas
- Catéteres
- Tratamiento atb prolongado

## **MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESTANDARES**

La aplicación de las medidas de prevención estándares a todos los pacientes puede prevenir y minimizar la dispersión del SARM, así como de otros microorganismos.

Estas medidas incluyen:

1. Lavado de manos después del contacto con cada paciente y de la retirada de guantes.
2. Uso de barreras:
  - a) Guantes no estériles: entre pacientes, distintos procedimientos y fluidos orgánicos.
  - b) Bata desechable, para prevenir el contacto de la ropa con los líquidos orgánicos.
  - c) Mascarilla y protector ocular si existe riesgo de salpicaduras en mucosas de líquidos orgánicos.
3. El descarte de elementos y la disposición final de los residuos se debe efectuar según la Ley que normaliza la manipulación de residuos hospitalarios.
4. El manejo de la ropa de cama se efectuará de acuerdo con la norma vigente en cada institución y colocándola en bolsas inmediatamente después de ser retirada de la cama.

El personal sanitario debe asumir su rol y la responsabilidad que tiene en la prevención de la transmisión de patógenos como el SARM y otros microorganismos.

## **SARM EN NUESTRA UNIDAD DE HEMODIALISIS**

Nuestra unidad de hemodiálisis forma parte de la infraestructura de un Hospital Comarcal de nivel AB (considerado nivel medio) de 168 camas.

La hospitalización de nefrología se encuentra ubicada en la planta de Medicina Interna, con una disposición de 5 camas.

Durante la realización de este trabajo la población media de hemodiálisis es de **56.94 pacientes**. Un **8.78%** (5 pacientes) de estos pacientes fueron colonizados o infectados por SARM. Se trata de un estudio descriptivo que abarca un periodo de tiempo de 18 meses (febrero 02/ julio 03).

Cronología de la población infectada:

<b>MES</b>	<b>Nº DE EPISODIOS NUEVOS</b>	<b>Nº DE PACIENTES INFECTADOS</b>	<b>% POBLACION HD INFECTADA</b>
Febrero 2002	1	1	<b>0.56 %</b>
Enero 2003	1	2	<b>1.39 %</b>
Febrero 2003	1	1	<b>0.56 %</b>
Marzo 2003	1	4	<b>2.28%</b>
Junio 2003	1	1	<b>0.56 %</b>

Características comunes de la población afectada:

- Edad superior a 60 años.
- Pluripatología (diabetes, lesiones cutáneas...)
- Higiene deficitaria .
- Hospitalizaciones repetidas
- Portadores de catéteres.

- Residentes en residencias geriátricas, centros sociosanitarios.

La aparición de estas infecciones, debido al SARM, provocó la necesidad de revisar junto con la comisión de infecciones y otros especialistas de nuestro centro (microbiólogo, comité de riesgos laborales, servicio de lavandería y técnicos de los monitores) el protocolo de SARM ya existente y adaptarlo a las necesidades de nuestra unidad, estableciéndose unas **medidas de actuación**.

## **OBJETIVO**

- **Implementar un protocolo de búsqueda.**

## **MATERIAL Y METODO**

Para la implementación de un protocolo debemos revisar los conocimientos del personal sanitario así como los procedimientos utilizados diariamente.

Tendremos presente que los mecanismos de transmisión por orden de importancia son (1):

1. De paciente a paciente a través de las manos del personal sanitario.
2. De personal sanitario a paciente por colonización nasal del personal.
3. Transmisión aérea y contaminación ambiental.
4. Entorno inanimado (discutido).

**Según refleja la literatura, el AISLAMIENTO debe ser de CONTACTO.**

## ACTUACIÓN GENERAL ANTE UN PACIENTE CON SARM

La mayoría de estas medidas de prevención son comunes a todos los pacientes pero en el caso de los infectados haremos especial hincapié en ellas.

- Es preferible usar material fungible de un solo uso, que material esterilizable.
- Material de curas individual.
- Fonendoscopio, esfigomanómetro, ..., de uso exclusivo durante la sesión.  
Una vez utilizados limpieza con desinfectantes adecuados.
- Lavado de manos con jabón de clorhexidina al 5%.
- Utilizaremos bata de manga larga y guantes para cualquier manipulación.  
Mascarilla sólo cuando la situación lo requiera.

## HIGIENE DEL ENTORNO

- Limpieza externa del monitor de hemodiálisis, cama, suelo y baldosas con una disolución de aldehidos:

**Limoseptol** : 1 sobre de 50 cc disuelto en 5 l de agua

La limpieza interna del monitor, según instrucciones del servicio técnico, deberá

hacerse de la manera habitual

- La ropa: saldrá de la sala de hemodiálisis en una doble bolsa, se envolsará evitando el contacto con el suelo y seguirá el circuito habitual de ropa sucia (sin necesidad de identificarla).
- El material de deshecho utilizado ( dializador, lineas, ...) seguirá el circuito habitual.
- La limpieza de la batea i kochers utilizados durante la sesión, así como termometro i smarck, lo sumergiremos durante 30 minutos en la siguiente

disolución de aldehidos:Limoseptol:1 sobre de 50cc disuelto en 5 l de agua.

### **TRASLADO DEL PACIENTE DENTRO DEL HOSPITAL**

- El paciente vendrá de hospitalización con la higiene realizada con clorhexidina al 5% y con ropa limpia.
- El personal que traslada al paciente usará guantes para su manipulación.
- Lavado higiénico de manos con clorhexidina al 5% antes y después del traslado.
- Si el paciente se traslada con silla de ruedas, deberá cubrirse ésta con una sábana que después deberá seguir el circuito de ropa sucia.

### **ORGANIZACIÓN DE LA UNIDAD**

- Los pacientes tenderán a agruparse en un mismo turno y espacio en la sala de hemodiálisis, obviamente utilizando siempre los mismos monitores.
- Se intentará que una misma enfermera sea la que asuma los pacientes infectados o portadores de SARM.
- Esta enfermera no estará en contacto con ningún paciente portador de cateter venoso central exento de SARM.

### **CONTROLES MÉDICOS**

Se efectuaran búsquedas de portadores nasales de SARM mediante un escobillón con una gota de suero, tanto en pacientes hemodializados como en trabajadores de la Unidad de Hemodialisis.

Estos controles se efectuarán dependiendo de los factores de riesgo.

Control Mensual:Portadores de cateteres vasculares,úlceras vasculares y de decúbito, pacientes con pie diabético y pacientes procedentes de residencias

geriátricas y/o centros sociosanitarios. También se cursarán en personal sanitario que hayan tenido algún control SARM positivo (hasta tener 2 controles consecutivos negativos).

Control Trimestral: Pacientes sin factores de riesgo y trabajadores.

### TRATAMIENTO DE LOS PORTADORES NASALES DE SARM

- Bactroban® nasal (mupirocina) 3 aplicaciones diarias en ambas fosas nasales durante 5 días. Contraindicación: pacientes con úlceras vasculares o de decúbito extensas.
- En caso de resistencia a mupirocina el tratamiento se realizará con Fucidine® (ácido fusídico) 3 aplicaciones diarias en ambas fosas nasales durante 5 días.

### CONTROL POSTRATAMIENTO

- Cinco días después de finalizar el tratamiento se realizará un nuevo control nasal para evaluar la eficacia del tratamiento.
- Si el resultado continúa evidenciando presencia de SARM se procederá a una segunda tanda del producto empleado anteriormente.

### **DISCUSION**

Apuntamos la utilidad, de tratar todo paciente portador de SARM como potencialmente infectado, entendiendo por colonizado cualquier portador Nasal, e infectado cuando presenta proceso séptico, bacteriemia, ...

El SARM es endémico en muchos centros hospitalarios, pudiendo llegar a ser una infección hospitalaria. La aparición de un SARM en una Unidad de Hemodiálisis no constituirá una situación excepcional. Recordemos que la edad



media de la población con tratamiento substitutivo, aumenta cada vez más así como su patología asociada; comportando ingresos repetidos que aumenta el riesgo de padecer infecciones nosocomiales intermitentes y persistentes en el tiempo.

## **CONCLUSIONES**

A partir de la actualización del protocolo podemos decir que los casos de SARM positivo se han estabilizado.

El agrupamiento de estos pacientes en un mismo turno facilita la labor de enfermería y permite llevar a cabo correcta y más rigurosamente las medidas preventivas.

La educación sanitaria es imprescindible y debemos recordar que forma parte de nuestra tarea diaria.

## **BIBLIOGRAFIA**

1. Grupo de trabajo EPINE. Estudio de prevalencia de las infecciones nosocomiales en los hospitales españoles. Protocolo del estudio del año 2001. Madrid: Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, 2001.
2. Alvarez-Lerma F, et al. Efectividad del aislamiento de contacto en el control de bacterias multiresistentes en un servicio de medicina intensiva. *Enferm Infecc Microbiol Clin* 2002; 20(2):57-63
3. Sopena N, Garcia-Núñez M, Prats R et al. Appearance of methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* sensitive to gentamicin in a hospital with a previous endemic distinct MRSA. *Eur J Epidemiol* 2002; 17:317-321

4. Dominguez M.A., Pujol M. Cambios en la epidemiologia de Staphylococcus Aureus resistente a la Meticilina. Recomendaciones para el control de su diseminación. Control Calidad SEIMC. Hospital Universitari de Bellvitge.
5. Andrew E. Simor, MD. Containing Methicillin-Resistant S aureus. Surveillance, control, and treatment methods. Vol 110 / No 4 / October 2001 / Postgraduate Medicine
6. Recommendations for Preventing Transmission of Infections Among Chronic Hemodialysis Patients. U.S. Department of Health and Human Services. Centers for disease Control and Prevention (CDC) Atlanta, GA 30333 2001 / Vol 50 / No RR-5
7. Colomer M, Roca S, Chirveches E, Roura P. Estandarización y resultados de las actividades de enfermería en el aislamiento de los enfermos portadores de MARSA en una sala de hemodiálisis. Hospital General de Vic. XXVII Congreso Nacional de la Sociedad Española de Enfermería Nefrológica. 2002

**Recursos informáticos:**

8. <http://www.adeci.org.ar/educacion/samr.htm>
9. [http://www.seimc.org/control/revi\\_Bacte/Marsactrl.htm](http://www.seimc.org/control/revi_Bacte/Marsactrl.htm)

